

日野川水系自然再生計画(素案)

【参考資料】

令和7年5月

中国地方整備局 日野川河川事務所

目 次

参考資料1	日野川水系の生物相	・ ・ ・ P1～P6
参考資料2	重要種の確認状況	・ ・ ・ P7～P12
参考資料3	河川環境管理シート	・ ・ ・ P13～P23
参考資料4	測量縦断の経年変化	・ ・ ・ P24～P25
参考資料5	通し回遊性の魚類・底生動物の確認状況	・ ・ ・ P26
参考資料6	魚類の遡上環境の劣化への対応状況（詳細）	・ ・ ・ P27
参考資料7	河床が泥・砂泥で緩水環境を好む多様な動植物が が生息する環境の創出の整備候補箇所の選定	・ ・ ・ P28

参考資料1 日野川水系の生物相

(1) 哺乳類、爬虫類、両生類

- ・河川水辺の国勢調査において、18種の哺乳類、12種の爬虫類、8種の両生類を確認。
- ・そのうち、哺乳類の1種、2種の爬虫類、3種の両生類が重要種に該当。

哺乳類																	
No.	目名	科名	種名	H5	H10	H15	H25・H26	R5	重要種				外来種				
									天然記念物	種の保存法	県希少	環境省RL	鳥取県RDB	外来生物法	生態系被害防止リスト		
1	モグラ	トガリネズミ	ジネズミ	●	●	●	●	●									
2		モグラ	ヒミズ			●											
3			コウベモグラ	●	●	●	●	●									
—			モグラ属				●	●									
4	コウモリ	ヒナコウモリ	モモジロコウモリ					●					NT				
—			ヒナコウモリ科			●	●	●									
—		—	コウモリ目	●	●												
5	ウサギ	ウサギ	ノウサギ			●											
6	ネズミ	ネズミ	ハタネズミ	●	●	●	●	●									
7			アカネズミ	●	●	●	●	●									
8			ヒメネズミ	●			●	●									
9			カヤネズミ	●	●	●	●	●									
10			ハツカネズミ				●									重点	
—				ネズミ科					●								
11				ヌートリア	ヌートリア	●	●	●	●	●						特定	緊急
12			ネコ	イヌ	タヌキ	●	●	●	●	●							
13	キツネ	●			●	●	●	●									
14	イタチ	テン(ホンドテン)						●	●								
15		シベリアイタチ						●	●						重点		
—		イタチ属		●	●	●	●	●									
16		アナグマ						●									
—		イタチ科						●									
17		イノシシ						●									
18		ニホンジカ					●										
計	5目	8科	18種	11種	10種	12種	13種	13種	—	—	—	—	1種	1種	3種		

爬虫類																
No.	目名	科名	種名	H5	H10	H15	H25・H26	R5	重要種					外来種		
									天然記念物	種の保存法	県希少	環境省RL	鳥取県RDB	外来生物法	生態系被害防止リスト	
1	有鱗	イシガメ	クサガメ		●											
2		ヌマガメ	ミシシippアカミミガメ					●						条件付特定外来	緊急	
3		スッポン	ニホンスッポン			●	●	●					DD	DD		
4		ヤモリ	ニホンヤモリ				●	●								
5		トカゲ	ニホントカゲ		●	●	●	●								
6		カナヘビ	ニホンカナヘビ		●	●	●	●	●							
7		ナミヘビ	シマヘビ		●	●	●	●	●							
8			アオダイショウ			●	●	●	●							
9			シロマダラ				●	●	●					DD		
10			ヒバカリ				●	●								
11			ヤマカガシ		●	●	●	●	●							
12			クサリヘビ	ニホンマムシ		●	●		●							
計	2目	8科	12種	4種	7種	8種	9種	8種	-	-	-	1種	2種	1種	1種	

両生類															
No.	目名	科名	種名	H5	H10	H15	H25・H26	R5	重要種					外来種	
									天然記念物	種の保存法	県希少	環境省RL	鳥取県RDB	外来生物法	生態系被害防止リスト
1	有尾	イモリ	アカハライモリ		●	●	●	●				NT	OT		
2	無尾	アマガエル	ニホンアマガエル	●	●	●	●	●							
3		アカガエル	トノサマガエル	●	●	●	●	●				NT			
4			ウシガエル			●	●	●						特定	重点
5			ツチガエル	●	●	●	●	●							
6		ヌマガエル	ヌマガエル		●	●	●	●							
7		アオガエル	シュレーゲルアオガエル			●	●	●							
8			カシガエル	●	●	●	●	●					OT		
計	2目	5科	8種	4種	6種	8種	9種	6種	-	-	-	2種	3種	1種	1種

- 注1) 分類体系
原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト－令和5年度版－(2023, 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課)」に従った。
- 注2) 重要種の選定基準
天然記念物：「文化財保護法」(1950, 法律第214号)
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(1992, 法律第75号)の国内希少野生動植物
県希少：「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」(2001, 条例第51号)
環境省RL：「環境省レッドリスト2020の公表について」(環境省, 2020)
NT：準絶滅危惧、DD：情報不足
鳥取県RDB：レッドデータブックとっとり第3版2022(鳥取県, 令和5年)
NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、OT：その他の重要種
- 注3) 外来種の選定基準
外来生物法：「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(2010, 環境省)
特定外来：特定外来生物
条件付特定外来：条件付特定外来生物
生態系被害防止リスト：「生態系被害防止外来種リスト」(2015, 環境省)
緊急：緊急対策外来種
重点：重点対策外来種
- 注4) ●：重要種、■：外来種を示す。

参考資料1 日野川水系の生物相

(2) 鳥類

- ・河川水辺の国勢調査において、130種の鳥類を確認。
- ・そのうち、38種の鳥類が重要種に該当。

No.	種名	個体数					重要種		外来種		
		H7	H12	H17	H26	R6	天然 記念物	種の 保存法	環境省 県希少	鳥取県 RDB	外来 生物法
1	キジ	●	●	●	●	●					
2	マガン	●	●	●	●	●	国定			NT	
3	コブハクチョウ	●	●	●	●	●					その他
4	コハクチョウ	●	●	●	●	●				NT	
5	オオハクチョウ	●	●	●	●	●				VU	
6	オシドリ	●	●	●	●	●			DD	NT	
7	オカヨシガモ	●	●	●	●	●					
8	ヨシガモ	●	●	●	●	●				NT	
9	ヒドリガモ	●	●	●	●	●					
10	アメリカヒドリ	●	●	●	●	●					
11	マガモ	●	●	●	●	●					
12	アヒル	●	●	●	●	●					
13	カルガモ	●	●	●	●	●					
14	ハシビロガモ	●	●	●	●	●					
15	オナガガモ	●	●	●	●	●					
16	トモエガモ	●	●	●	●	●			VU	VU	
17	コガモ	●	●	●	●	●					
一	マガモ属の一種	●	●	●	●	●					
18	ホシハジロ	●	●	●	●	●					
19	キンクロハジロ	●	●	●	●	●					
20	スズガモ	●	●	●	●	●					
21	ホオジロガモ	●	●	●	●	●				NT	
22	ミコアイサ	●	●	●	●	●				NT	
23	カワアイサ	●	●	●	●	●					
24	ウミアイサ	●	●	●	●	●					
25	カイツブリ	●	●	●	●	●					
26	カンムリカイツブリ	●	●	●	●	●					
27	ハジロカイツブリ	●	●	●	●	●					
28	カワラヒト(ドハト)	●	●	●	●	●					
29	キジバト	●	●	●	●	●					
30	カワウ	●	●	●	●	●					
31	ゴイサギ	●	●	●	●	●				NT	
32	ササゴイ	●	●	●	●	●				VU	
33	アマサギ	●	●	●	●	●					
34	アオサギ	●	●	●	●	●					
35	ダイサギ	●	●	●	●	●					
36	チュウサギ	●	●	●	●	●			NT	VU	
37	コサギ	●	●	●	●	●				NT	
38	カラシラサギ	●	●	●	●	●			NT		
39	クイナ	●	●	●	●	●				NT	
40	バン	●	●	●	●	●					
41	オオバン	●	●	●	●	●					
42	ホトギス	●	●	●	●	●					
43	カッコウ	●	●	●	●	●					
44	アマツバメ	●	●	●	●	●					
45	タゲリ	●	●	●	●	●				NT	
46	ダイゼン	●	●	●	●	●					
47	イカルチドリ	●	●	●	●	●				NT	
48	コチドリ	●	●	●	●	●					
49	シロチドリ	●	●	●	●	●			VU		
50	メダイチドリ	●	●	●	●	●					
51	タシギ	●	●	●	●	●					
52	チュウシャクシギ	●	●	●	●	●					
53	アオアシシギ	●	●	●	●	●					
54	クサシギ	●	●	●	●	●					
55	タカアシシギ	●	●	●	●	●			VU		
56	キアシシギ	●	●	●	●	●					
57	ソリハシシギ	●	●	●	●	●					
58	イソシギ	●	●	●	●	●					
59	キョウジョシギ	●	●	●	●	●					
60	オハシギ	●	●	●	●	●					
61	トウネン	●	●	●	●	●					
62	ハマシギ	●	●	●	●	●			NT		
63	ヨリカモメ	●	●	●	●	●					
64	ズグロカモメ	●	●	●	●	●			VU	VU	
65	ウミネコ	●	●	●	●	●					

No.	種名	個体数					重要種				外来種		
		H7	H12	H17	H26	R6	天然 記念物	種の 保存法	県希少	環境省 RL	鳥取県 RDB	外来 生物法	生態系被害 防止リスト
66	カモメ	●	●	●	●								
67	シロカモメ	●									NT		
68	セグロカモメ	●	●		●	●							
69	オオセグロカモメ	●	●	●	●					NT			
70	コアシサシ	●	●	●	●	●			希少	VU	CR+EN		
71	アジサシ	●											
72	クロハラアジサシ		●										
73	ミサゴ	●	●	●	●	●				NT	NT		
74	ハチクマ		●	●		●				NT	NT		
75	トビ	●	●	●	●								
76	ハイロチュウヒ	●				●					CR+EN		
77	ハイタカ		●			●				NT	NT		
78	オオタカ	●	●		●					NT	VU		
79	ノスリ	●	●	●	●	●					NT		
80	フクロウ					●					NT		
81	アオバズク					●					NT		
82	コミズク	●									CR+EN		
83	カワセミ	●	●	●	●	●							
84	ヤマセミ	●	●	●							VU		
85	フッポウソウ		●						希少	EN	CR+EN		
86	コゲラ	●	●	●	●	●							
87	アカゲラ				●								
88	チョウゲンボウ					●							
89	ハヤブサ	●	●	●	●	●		国内		VU	VU		
90	モズ	●	●	●									
91	ミヤマガラス	●	●			●							
92	ハシボソガラス	●	●	●	●	●							
93	ハシブトガラス	●	●	●	●	●							
94	ヤマガラス		●	●		●							
95	シジュウカラ			●	●	●							
96	ヒバリ	●	●	●	●	●							
97	ツバメ	●	●	●	●	●							
98	コシアカツバメ	●	●	●		●					VU		
99	イトツバメ	●	●	●	●	●							
100	ヒヨドリ	●	●	●	●	●							
101	ウグイス	●	●	●	●	●							
102	エナガ	●	●	●	●	●							
103	メジロ	●	●	●	●	●							
104	オオヨシキリ	●	●	●	●	●							
105	コヨシキリ	●	●	●									
106	セッカ	●	●	●	●	●					NT		
107	ムクドリ	●	●		●	●							
108	コムクドリ			●									
109	カワガラス	●		●	●	●							
110	シロハラ		●	●	●	●							
111	ツグミ	●	●	●	●	●							
112	ジョウビタキ	●	●	●	●	●							
113	ノビタキ		●										
114	インレヨドリ		●	●		●							
115	キビタキ				●								
116	オオルリ		●										
117	スズメ	●	●	●	●	●							
118	キセキレイ	●	●	●	●	●							
119	ハクセキレイ	●	●	●	●	●							
120	セグロセキレイ	●	●	●	●	●							
121	ビンズイ	●									NT		
122	タヒバリ	●		●	●	●							
123	アトリ		●										
124	カワラヒワ	●		●	●	●							
125	ベニマシコ		●		●	●							
126	イカル	●	●	●	●	●							
127	ホオジロ	●	●	●	●	●							
128	カシラダカ	●		●	●	●							
129	アオジ	●	●	●	●	●							
130	オオジュリン	●											
会社	130種	92種	92種	91種	88種	95種	1種	1種	2種	17種	33種	0種	1種


- 注1) 分類体系
分類群は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（令和6年）」に従った。
- 注2) 重要種の選定基準
天然記念物：
「文化財保護法」（1950，法律第214号）及び条例により指定された種
国定：国指定の天然記念物
種の保存法：
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（1992，法律第75号）の国内希少野生動植物
国内：国内希少野生動植物種
県希少：
「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」（2001，条例第51号）
環境省RL：
「環境省レッドリスト2020の公表について」（環境省，令和2年3月27日）
EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足
鳥取県RDB：
レッドデータブックとっとり第3版2022（鳥取県，令和5年）
CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧
- 注3) 外来種の選定基準
外来生物法：
「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」（2010，環境省）
生態系被害防止リスト：
「生態系被害防止外来種リスト」（2015，環境省）
その他：その他の総合対策外来種
- 注4) ■：重要種、■：外来種を示す。

参考資料1 日野川水系の生物相

(3) 陸上昆虫類

- ・河川水辺の国勢調査において、2388種の陸上昆虫類を確認。
- ・そのうち、60種の陸上昆虫類が重要種に該当。

確認種 目名	H4		H9		H14		H20		H30		合計	
	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数
クモ目	18	83	21	108	15	76	22	102	18	95	27	189
カゲロウ目	7	12	8	12	6	7	6	6	6	9	9	21
トンボ目	7	17	9	30	8	26	8	25	8	37	9	49
ゴキブリ目	1	2	1	1	1	2	2	5	2	3	2	5
カマキリ目	1	3	1	1	1	4	1	5	1	2	1	5
ハサミムシ目	1	1	3	6	3	4	2	4	2	4	4	8
カワゲラ目	3	5	3	4	2	3	2	2	1	2	3	8
バッタ目	12	38	11	37	12	49	14	51	12	50	16	69
ナナフシ目	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
カメムシ目	24	83	35	143	36	161	34	144	36	140	44	283
ハビトンボ目	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
アミメカゲロウ目	0	0	2	2	0	0	2	2	1	1	4	5
シリアゲムシ目	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2
トビケラ目	13	30	11	23	6	8	11	22	9	17	16	47
チョウ目	19	244	17	213	25	306	12	68	17	140	26	490
ハエ目	10	34	12	31	16	48	17	90	13	75	18	163
コウチュウ目	41	323	57	469	52	437	48	369	44	375	68	845
ハチ目	16	78	21	97	14	73	19	95	20	105	23	197
合計	175	955	214	1179	200	1207	202	992	191	1056	274	2388



要種										重要種				
No.	目名	科名	和名	H4	H9	H14	H20	H30	天然 記念物	種の 保存法	県希少	環境省 RL	鳥取県 RDB	
1	トンボ目	カワトンボ科	アオハダトンボ	●	●	●	●	●				NT	NT	
2			ニホンカワトンボ		●	●		●					OT	
3			アサヒナカワトンボ	●									OT	
4		サナエトンボ科	キヒロサナエ					●				NT	NT	
5			ホシサナエ				●						NT	
6			アキアカネ	●	●			●					NT	
7	カマキリ目	カマキリ科	ウスバカマキリ	●		●	●					DD	NT	
8		マツムシ科	カヤコオロギ			●					希少		VU	
9		バッタ科	ショウリョウバッタモドキ			●		●					NT	
10	カメムシ目	イナゴ科	ヤマトフキバッタ			●							OT	
11			コオイムシ科	コオイムシ			●	●					NT	NT
12			オオコオイムシ				●	●					NT	
13		タイコウチ科	タガメ	●	●	●				国内	希少	VU	VU	
14			タイコウチ		●			●					NT	
15			セセリチョウ科	ギンイチモンジセセリ	●		●	●					NT	NT
16	チョウ目	セセリチョウ科	オオチャバネセセリ	●	●	●	●						NT	
17			シジミチョウ科	シルビアシジミ		●	●	●	●			希少	EN	CR+EN
18			アゲハチョウ科	ウスバシロチョウ		●								NT
19		シロチョウ科	ツマグロキチョウ				●					EN	NT	
20			ヒトリガ科	ヤネホリバ	●									NT
21			ヤガ科	カギモンハナオイアツバ	●				●					NT
22	コウチュウ目	オサムシ科	キシタアツバ	●	●	●	●						NT	
23			ナカスジキョウトウ	●		●								DD
24			セアカオサムシ	●	●								NT	NT
25		ハシロチョウ科	ニセトックリゴミムシ	●	●	●							DD	
26			オオトックリゴミムシ			●		●				NT	DD	
27			イグチケバカゴミムシ		●							NT	DD	
28	ゲンゴロウ目	ハシロチョウ科	ナミハシロ		●	●		●					NT	
29			エリザハシロ		●	●		●					NT	
30			クロゲンゴロウ		●		●	●			希少	NT	VU	
31		シマゲンゴロウ科	コガタノゲンゴロウ	●	●		●	●			希少	VU	VU	
32			シマゲンゴロウ	●	●						希少	NT	VU	
33			ケシゲンゴロウ	●	●						希少	NT	DD	
34	ミズスマシ科	マルチビゲンゴロウ科	マルチビゲンゴロウ				●					NT		
35			コナガミズスマシ		●							VU		
36			コガシラミズムシ科	クビボツコガシラミズムシ				●				DD		
37		ガムシ科	ヤマトゴマフガムシ		●	●		●					NT	
38			ゴマフガムシ	●	●	●					希少		VU	
39			コガムシ	●	●	●	●	●				DD		
40	ハチ目	ガムシ科	ガムシ	●	●	●	●					NT	NT	
41			シジミガムシ	●	●	●	●	●				EN		
42			ヒメガムシ	●	●	●	●	●					DD	
43		シデムシ科	ヤマトモンシデムシ	●	●							NT		
44			ヒメドロムシ科	ヨコミゾドロムシ		●			●			VU	NT	
45			ケスジドロムシ						●			VU	NT	
46	ジョウカイボン目	ジョウカイボン科	ジョウカイボン西日本亜種	●	●	●	●						OT	
47			ホタル科	ヘイケボタル			●		●				NT	
48			カミキリムシ科	ヨツボシカミキリ	●								EN	DD
49	ハチ目	セイボウ科	オオセイボウ		●		●					DD		
50			アリ科	トゲアリ					●			VU		
51			スズメバチ科	ヤマトアシナガバチ				●	●				DD	DD
52		モンズズメバチ		●		●		●				DD		
53		クモバチ科		アケボノクモバチ				●	●				DD	DD
54		ハチ目	ドロバチモドキ科	フタモンクモバチ		●							NT	
55	キアシハナダカバチモドキ						●	●			希少	VU	VU	
56	ミツバチ科			クロマルハナバチ					●				NT	
57	ハキリバチ科		キヌゲハキリバチ			●	●	●					NT	
58			クズハキリバチ		●							DD		
59			キバラハキリバチ			●		●				NT	DD	
60		マイマイツツハナバチ	●	●	●		●				DD	NT		
計	7目	33科	60種	24種	31種	24種	22種	32種	0種	1種	8種	39種	45種	

注1) 分類体系
分類群は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト－令和5年度版－」に従った。

注2) 重要種の選定基準
天然記念物：「文化財保護法」（1950，法律第214号）及び条例により指定された天然記念物
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（1992，法律第75号）の国内希少野生動植物
国内：国内希少野生動植物種
県希少：「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」の指定種（2001，条例第51号）
環境省RL：「環境省レッドリスト2020の公表について」（環境省，2020）
EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足
鳥取県RDB：レッドデータブックとっとり第3版2022（鳥取県，令和5年）
CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、OT：その他の重要種

注3) 外来種の選定基準
外来生物法：「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」（2010，環境省）の特定外来生物
生態系被害防止リスト：「生態系被害防止外来種リスト」（2015，環境省）の記載種
※外来種の選定基準に該当する種は確認されていない。

参考資料1 日野川水系の生物相

(4) 魚類

- ・河川水辺の国勢調査において、75種の魚類を確認。
- ・そのうち、16種の魚類が重要種に該当。

No.	和名	H6	H11	H16	H21	H26	R1	R6	重要種					外来種		
									天然記念物	種の保存法	県希少	環境省RL	鳥取県RDB	外来生物法	生態系被害防止リスト	
1	スナヤツメ南方種	●	●	●	●	●	●	●			希少	VU	VU			
2	カワヤツメ	●	●	●	●	●	●	●				VU	DD			
3	ニホンウナギ	●	●	●	●	●	●	●				EN	NT			
4	サツバ		●													
5	コノシロ							●								
6	コイ(飼育型)						●	●								
-	コイ(型不明)	●	●	●	●	●										
-	コイ(改良品種型)				●											
7	ゲンゴロウブナ				●			●				EN				
8	ギンブナ	●	●	●	●	●	●	●								
-	フナ属						●									
9	ヤリタナゴ	●		●	●	●		●				NT	NT			
10	ミナミアカヒレタビラ		●	●	●	●					希少	CR	CR+EN			
11	タイリクバラタナゴ		●	●	●	●	●	●							重点	
12	オイカワ	●	●	●	●	●	●	●								
13	カワムツ	●	●	●	●	●	●	●								
14	タカハヤ	●	●	●	●	●	●	●								
15	ウグイ	●	●	●	●	●	●	●								
16	モツゴ	●	●	●	●	●	●	●								
17	ムギツク	●	●	●	●	●	●	●								
18	タモロコ			●	●	●	●	●								
19	カマツカ	●	●	●	●	●	●	●								
20	ドジョウ	●	●	●	●	●	●	●				NT	DD			
21	ニジシマドジョウ	●	●	●	●	●	●	●								
22	サンインコガタスジマドジョウ	●	●	●	●	●	●	●				EN	NT			
23	ナマズ	●	●	●	●	●	●	●								
24	アカザ			●	●	●	●	●			希少	VU	CR+EN			
25	ワカサギ			●	●	●	●	●					NT			
26	アユ	●	●	●	●	●	●	●								
27	サケ		●	●	●	●	●	●								
28	サクラマス		●	●	●	●	●	●				NT	NT			
29	サツキマス(アマゴ)		●			●										
30	ガンテンイシヨウジ							●				NT				
31	ボラ			●	●	●	●	●								
32	メナダ		●	●	●	●	●	●								
33	ミナミメダカ	●	●	●	●	●	●	●			希少	VU	VU			
34	サヨリ		●													
35	マゴチ				●	●	●	●								
-	コチ属						●	●								
36	オヤニラミ		●	●	●	●	●	●				EN	DD			

No.	和名	H6	H11	H16	H21	H26	R1	R6	重要種					外来種		
									天然記念物	種の保存法	県希少	環境省RL	鳥取県RDB	外来生物法	生態系被害防止リスト	
37	ヒラスズキ							●								
38	スズキ		●	●	●	●	●	●								
39	ブルーギル							●							特定	緊急
40	オオクチバス							●							特定	緊急
41	ヒイラギ						●	●								
42	クロサギ属						●	●								
43	クロダイ					●	●	●								
44	シロギス			●				●								
45	コトヒキ属						●	●								
46	シマイサキ				●	●	●	●								
-	シマイサキ科		●				●	●								
47	カマキリ(アユカケ)	●	●	●	●	●	●	●				VU	VU			
48	カシカ中卵型							●				EN				
49	ドンコ	●	●	●	●	●	●	●								
50	カワアナゴ						●	●					DD			
51	ミズハゼ		●	●	●	●	●	●								
52	シロウオ			●				●			希少	VU	VU			
53	マハゼ		●	●	●	●	●	●								
54	アシシロハゼ		●	●	●	●	●	●								
55	アベハゼ						●	●								
56	シモフリシマハゼ						●	●								
57	ヌマチチブ	●	●	●	●	●	●	●								
58	チチブ				●			●								
-	チチブ属						●	●								
59	ヒナハゼ			●			●	●								
60	カワヨシノボリ	●	●	●	●	●	●	●								
61	シマヨシノボリ	●	●	●	●	●	●	●								
62	オオヨシノボリ	●	●	●	●	●	●	●					NT			
63	ゴクラクハゼ	●	●	●	●	●	●	●								
64	トウヨシノボリ類	●	●	●			●	●								
-	ヨシノボリ属						●	●								
65	ウロハゼ						●	●								
66	ヒメハゼ			●	●	●	●	●								
67	スミウキゴリ			●	●	●	●	●								
68	ウキゴリ	●	●	●	●	●	●	●								
69	サツキハゼ						●	●								
70	カムルチー						●	●								
71	ヒラメ		●					●								
72	イシガレイ							●								
73	マフグ			●	●			●								
74	コモンフグ						●	●								
75	クサフグ						●	●								
合計	75種	27種	42種	45種	46種	44種	52種	61種	-	-	5種	13種	16種	2種	3種	

注1) 分類体系

分類群は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(令和6年)」に従った。

注2) 重要種の選定根拠

天然記念物：「文化財保護法」(1950, 法律第214号)及び条例により指定された種

種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(1992, 法律第75号)の国内希少野生動植物

県希少：「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」(2001, 条例第51号)

環境省RL：「環境省レッドリスト2020の公表について」(環境省, 令和2年3月27日)

CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧

鳥取県RDB：レッドデータブックとっとり第3版2022(鳥取県, 令和5年)

CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足

注3) 外来種の選定根拠

外来生物法：「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」(2010, 環境省)

特定：特定外来生物

生態系被害防止リスト：「生態系被害防止外来種リスト」(2015, 環境省)

緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種

注4) ●：重要種、■：外来種を示す。


注5) 日野川水系において、ゲンゴロウブナ、サツキマス(アマゴ)、オヤニラミは国内外来種であるため、重要種として扱わないこととした。

参考資料1 日野川水系の生物相

(6) 植物

- ・河川水辺の国勢調査において、842種の植物を確認。
- ・そのうち、21種の植物が重要種に該当。

分類		H8		H13		H19		H24		R3		合計	
		科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数
シダ植物	裸子植物	12	37	14	30	12	25	13	28	9	22	15	50
	被子植物	3	4	3	4	1	1	1	2	1	1	3	5
	単子葉類	15	166	18	130	16	163	14	109	14	147	20	243
	双子葉類	69	347	71	309	77	363	74	311	72	363	85	537
合計		103	560	108	477	110	557	106	455	100	538	127	842



No.	科名	和名	H8	H13	H19	H24	R3	重要種				
								天然記念物	種の保存法	県希少	環境省RL	鳥取県RDB
1	ドクダミ科	ハンゲショウ	●									NT
2	ウマノスズクサ科	ウマノスズクサ	●		●	●	●					NT
3	トチカガミ科	ミズオオバコ		●						希少	VU	VU
4	ヒルムシロ科	イトモ			●						NT	NT
5		エビモ	●	●	●	●						DD
6		ホソバミズヒキモ			●							NT
7	ヤマノイモ科	ヒメドコロ		●	●							NT
8	カヤツリグサ科	オニスゲ	●									NT
9		シオクグ	●							希少		CR+EN
10	イネ科	チョウセンガリヤス	●									DD
11	ケシ科	ナガミノツルケマン	●	●	●		●				NT	OT
12	マンサク科	アデツマンサク			●						NT	DD
13	アリノトウグサ科	ホザキノフサモ	●	●	●	●	●			希少	VU	VU
14	マメ科	イヌハギ	●	●	●	●	●					NT
15	クワ科	ケグワ			●							NT
16	バラ科	シャリンバイ			●	●	●			希少	VU	OT
17	カバノキ科	カワラハシノキ	●	●	●	●	●					OT
18	コムカンソウ科	ヒトツバハギ	●							希少	VU	DD
19	ヤナギ科	サイコクキツネヤナギ		●	●							NT
20	ミカン科	フユザンショウ		●								NT
21	オオバコ科	カワヂシャ	●	●	●						NT	NT
合計	18科	21種	12種	10種	14種	6種	6種	0種	0種	5種	6種	19種

No.		科名	和名	H8	H13	H19	H24	R3	外来種	
									外来生物法	生態系被害防止リスト
1	トチカガミ科	オオカナダモ	●	●	●	●	●	●		重点
2		コカナダモ	●	●	●	●	●	●		重点
3	ユリ科	シンデットウユリ		●						その他
4	アヤメ科	ヒメヒオウギスイセン	●	●	●	●	●	●		その他
5		キシウフ	●	●	●	●	●	●		重点
6	ツクサ科	ノハカタカラクサ		●	●	●	●	●		重点
7	カヤツリグサ科	メリケンガヤツリ		●	●	●	●	●		重点
8	イネ科	コヌカグサ	●	●	●	●	●	●		産業管理
9		メリケンカルカヤ	●	●	●	●	●	●		その他
10		ハルガヤ	●	●	●	●	●	●		その他
11		カモガヤ	●	●	●	●	●	●		産業管理
12		シナダレスズメガヤ	●	●	●	●	●	●		重点
13		オオクサキ	●	●	●	●	●	●		その他
14		シマスズメノヒエ		●	●	●	●	●		その他
15		キシウスズメノヒエ		●	●	●	●	●		その他
16		オオウガエリ		●	●	●	●	●		産業管理
17		オニウシノケグサ	●	●	●	●	●	●		産業管理
18		ナギナタガヤ	●	●	●	●	●	●		産業管理
19	マメ科	イタダキ	●	●	●	●	●	●		重点
20		エニシダ		●	●	●	●	●		その他
21		ハリエンジュ		●	●	●	●	●		産業管理
22	クワ科	ヤマガワ	●	●	●	●	●	●		重点
23	バラ科	ビワ	●	●	●	●	●	●		産業管理
24	ウリ科	アレチウリ	●	●	●	●	●	●	特定	緊急
25	トウダイグサ科	ナンキンハゼ	●	●	●	●	●	●		その他
26	アカバナ科	コマツヨイグサ	●	●	●	●	●	●		重点
27	ニガキ科	ニワウルシ	●	●	●	●	●	●		重点
28	アオイ科	フヨウ	●	●	●	●	●	●		その他
29	アブラナ科	カラシナ	●	●	●	●	●	●		その他
30		オニハマダイコン	●	●	●	●	●	●		その他
31		オランダガラシ	●	●	●	●	●	●		重点
32	タデ科	シヤクチリソバ		●	●	●	●	●		その他
33		ヒメツルソバ		●	●	●	●	●		その他
34		ヒメスイバ	●	●	●	●	●	●		その他
35		ナガバキギシ	●	●	●	●	●	●		その他
36		ギシギシ	●	●	●	●	●	●		その他
37		エゾノギシギシ	●	●	●	●	●	●		その他
38	ナデシコ科	ムシトリナデシコ	●	●	●	●	●	●		その他
39		マンデマ	●	●	●	●	●	●		その他
40	スベリヒコ科	ヒメマツバボタン		●	●	●	●	●		重点
41	マタタビ科	キウイフルーツ		●	●	●	●	●		産業管理
42	アカネ科	オオフタバムグラ		●	●	●	●	●		その他
43	キョウチクトウ科	ツルニチニチソウ	●	●	●	●	●	●		重点
44	ヒルガオ科	アメリカネナシカズラ	●	●	●	●	●	●		その他
45		ホシアサガオ		●	●	●	●	●		その他
46	モクセイ科	トウネズミモチ		●	●	●	●	●		重点
47	オオバコ科	オオバコ	●	●	●	●	●	●		重点
48		オオカワヂシャ		●	●	●	●	●	特定	緊急
49	キク科	オオバタクサ		●	●	●	●	●		重点
50		アメリカセンダングサ	●	●	●	●	●	●		その他
51		オオキンケイギク		●	●	●	●	●	特定	緊急
52		ヒメジョオン	●	●	●	●	●	●		その他
53		フランスギク	●	●	●	●	●	●		その他
54		オオハシゴソウ		●	●	●	●	●	特定	緊急
55		セイタカアワダチソウ	●	●	●	●	●	●		重点
56		オオアワダチソウ	●	●	●	●	●	●		重点
57		オオナモミ	●	●	●	●	●	●		その他
合計	25科	57種	35種	41種	47種	37種	46種	4種	4種	57種

注1) 分類体系
分類群は「河川水辺の国勢調査のための生物リストー令和2年度版ー」に従った。

注2) 重要種の選定根拠
天然記念物：
「文化財保護法」（1950，法律第214号）及び
条例により指定された種
種の保存法：
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に
関する法律」（1992，法律第75号）の国内希少
野生動植物
県希少：
「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」
（2001，条例第51号）
環境省RL：
「環境省レッドリスト2020の公表について」
（環境省，2020）
VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧

鳥取県RDB：
鳥取県RDB：レッドデータブックととり第3版
2022（鳥取県，令和5年）
CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、
NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、OT：その他
の重要種

注3) 外来種の選定根拠
外来生物法：
「特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律」（2010，環境省）
条件付特定：
特定外来生物に指定された生物のうち、飼育
などに関する規制の一部が当面の間、適用除
外とされている生物
生態系被害防止リスト：
「生態系被害防止外来種リスト」（2015，環境
省）
緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、
その他：その他の総合対策外来種、産業管理：
産業管理外来種

参考資料2 重要種の確認状況

(1) 哺乳類、両生類、両生類

・河川水辺の国勢調査において確認された、哺乳類、爬虫類の、両生類の重要種は以下のとおり。


哺乳類：モモジロコウモリ

爬虫類：ニホンスッポン、シロマダラ

両生類はトノサマガエル、トノサマガエル、カジカガエル

重要種保護の観点より非公表

重要種保護の観点より非公表



- 備考1) 河川水辺の国勢調査における確認状況を示す。
2) 表中の数字は個体数を示す。
3) *印は、個体数不明の記録を含む。
(個体数不明の記録は1個体として集計。)
4) 確認状況の詳細が不明であった、H5のカジカガエルは整理対象外とした。
5) ハッチ掛けが示す事項は以下のとおり。
- オレンジ色：増加種（最新2ヶ年以上で個体数が増加）
 - 水色：減少種（最新2ヶ年以上で個体数が減少）
 - 紫色：消失種（最新2ヶ年以上で確認が無い）

参考資料2 重要種の確認状況


(2) 鳥類

・河川水辺の国勢調査において確認された鳥類の重要種は以下のとおり。

鳥類：コハクチョウ、オシドリ、ミコアイサ、ササゴイ、イカルチドリ、コアジサシ、ミサゴ、ノスリ、ヤマセミ、ハヤブサ、コシアカツバメ、セッカ等、38種

重要種保護の観点より非公表

重要種保護の観点より非公表




参考資料2 重要種の確認状況

(3) 陸上昆虫類

- 河川水辺の国勢調査において確認された陸上昆虫類の重要種は以下のとおり。
陸上昆虫類：アオハダトンボ、シルビアシジミ、コガムシ、ジョウカイボン西日本亜種等、60種

重要種保護の観点より非公表



重要種保護の観点より非公表

参考資料2 重要種の確認状況


(4) 魚類

・河川水辺の国勢調査において確認された魚類の重要種は以下のとおり。

魚類：スナヤツメ南方種、ニホンウナギ、ミナミアカヒレタビラ、ドジョウ、サンインコガタスジシマドジョウ、アカザ、サクラマス、ミナミメダカ、カマキリ（アユカケ）等、16種

重要種保護の観点より非公表

重要種保護の観点より非公表



- 備考1) 河川水辺の国勢調査における確認状況を示す。
2) 表中の数字は個体数を示す。
3) *印は、個体数不明の記録を含む。
(個体数不明の記録は1個体として集計。)
4) サクラマスには、同種で生活史が異なるヤマメを含む。
5) ハッチ掛けが示す事項は以下のとおり。
- オレンジ色：増加種（最新2ヶ年以上で個体数が増加）
 - 水色：減少種（最新2ヶ年以上で個体数が減少）
 - 紫色：消失種（最新2ヶ年以上で確認が無い）


参考資料2 重要種の確認状況

(5) 底生動物

- 河川水辺の国勢調査において確認された底生動物の重要種は以下のとおり。
底生動物：イシマキガイ、モノアラガイ、カワコザラガイ、ヤマトシジミホンサナエ等、23種

重要種保護の観点より非公表

重要種保護の観点より非公表



- 備考1) 河川水辺の国勢調査における確認状況を示す。
2) 表中の数字は個体数を示す。
3) *印は、個体数不明の記録を含む。
（個体数不明の記録は1個体として集計。）
4) 確認状況の詳細が不明であった、ニホンカワトンボ、アサヒナカワトンボ、オオコオイムシ、タイコウチ、ツブゲンゴロウ、ヒメガムシ、ヘイケボタルの7種は整理対象外とした。
5) ハッチ掛けが示す事項は以下のとおり。

参考資料2 重要種の確認状況


(6) 植物

・河川水辺の国勢調査において確認された植物の重要種は以下のとおり。

植物：ウマノスズクサ、エビモ、ナガミノツルケマン、ホザキノフサモ、イヌハギ、カワラハシノキ等、21種

重要種保護の観点より非公表

重要種保護の観点より非公表



- 備考1) 河川水辺の国勢調査における確認状況を示す。
2) 表中の数字は個体数を示す。
3) *印は、個体数不明の記録を含む。
(個体数不明の記録は1個体として集計。)
4) ハッチ掛けが示す事項は以下のとおり。



参考資料3 河川環境管理シート

(2) 代表区間・保全区間の選定結果

日野川

河川環境区分シート

- 河川環境区分は、河川環境が類似し、相対的な順位付けが可能な範囲で、河川管理上、効率的な数に区分する。
- 河川環境区分の設定に際しては、「河川整備基本方針」、「河川整備計画」の境界部と整合を図ることが重要である。



代表区間選定シート

◆ 生息場の多様性の評価

「河川環境区分」ごとに各環境要素の中央値を算出し、中央値を基準に区分毎に評価(○×△)する。

区分毎に評価値を集計する。

区分1

		距離幅(空間単位:1km)	0	1	2
典型性	陸域	1. 低・中草地	○	△	○
		2. 河辺性の樹林・河畔林	○	△	○
		3. 自然裸地	○	△	○
		4. 外来植物生育地	×	△	×
	水際域	5. 水生植物帯	△	○	○
		6. 水際の自然度	△	○	○
		7. 水際の複雑さ	○	△	○
	水域	8. 連続する瀬と淵	○	△	○
		9. ワンド・たまり	△	○	○
	汽水	10. 湛水域	△	○	○
		11. 干潟	○	○	△
		12. ヨシ原	○	○	△
生息場の多様性の評価値			2	3	3

区分2

距離帯(空間単位:1km)		3	4	5	6	7	8	9
典型性	陸域	1. 低・中草地	○	○	○	△	△	△
		2. 河辺性の樹林・河畔林	○	○	△	○	△	△
		3. 自然裸地	△	△	○	△	○	○
		4. 外来植物生育地	△	×	×	×	×	×
	水際域	5. 水生植物帯	△	△	△	○	○	○
		6. 水際の自然度	△	△	○	○	○	○
		7. 水際の複雑さ	○	○	△	△	△	△
		8. 連続する瀬と淵	○	○	△	△	△	△
	水域	9. ワンド・たまり	○	○	○	△	△	△
		10. 湛水域	×	×	×	×	×	×
	汽水	11. 干潟	-	-	-	-	-	-
		12. ヨシ原	-	-	-	-	-	-
生息場の多様性の評価値		5	1	4	5	3	5	5

区分3

		距離域(空間単位:1km)	10	11	12	13	14	15
典型性	陸域	1. 低・中草地	△	△	○	△	△	○
		2. 河辺性の樹林・河畔林	○	△	△	○	△	△
		3. 自然裸地	○	△	△	○	△	△
		4. 外来植物生育地	△	△	×	×	×	×
	水際域	5. 水生植物帯	○	△	△	○	△	△
		6. 水際の自然度	○	△	△	○	△	△
		7. 水際の複雑さ	○	△	△	○	△	△
		8. 連続する瀬と淵	△	○	△	△	△	△
	水域	9. ワンド・たまり	△	△	△	○	△	△
		10. 湛水域	△	×	×	△	×	×
	汽水	11. 干潟	-	-	-	-	-	-
		12. ヨシ原	-	-	-	-	-	-
生息場の多様性の評価値		5	1	3	5	6	4	

<典型性12項目の評価方法>

①~③, ⑤~⑦, ⑨, ⑪, ⑫

中央値より大: ○ (1点)

中央値より小: △ (0点)

④⑩

中央値より大: × (-1点)

中央値より小: △ (0点)

⑧

瀬・淵の両方が中央値より大: ○ (1点)

瀬・淵のどちらかが中央値より大: △ (0点)

評価対象外であることを示す

◆ 生物との関わりの強さの評価

「河川環境区分」ごとに注目種を選定する。(選定手順は右上図参照)

区分毎に注目種が依存する環境要素(典型性12項目)の多寡を「○」の数にて評価する。

		距離標(空間単位:1km)	0	1	2
生物との関わり の強さの 評価値	魚類	シロウオ	○	○	○
		河口域	○	○	○
		コアジサシ	3	0	0
	鳥類	自然裸地	○	△	○
		ミコアイサ	2	0	1
		湛水域	△	○	○
生物との関わり強さの評価値		2	1	3	

		距離標 (空間単位:1km)	3	4	5	6	7	8	9	
特徴数と依存する生息場（注目生息場）	魚類	アユ	○	○	○	△	△	△	△	
		連続する瀬と淵	○	○	○	△	○	○	○	
		ミナメダカ	○	○	○	○	○	○	○	
		ワンド・たまり	○	○	○	○	△	△	△	
	鳥類	オオヨシキリ	△	4	1	4	1	0	4	2
		水生植物帯	△	△	△	○	△	○	△	△
		イカルチドリ	○	0	1	2	0	1	0	4
		自然裸地	△	△	△	○	△	○	△	○
	両生類	コハクチョウ	○	55	0	0	0	0	0	0
		低・中草地	○	○	○	○	△	△	△	△
		水生植物帯	○	○	○	○	△	△	△	△
		自然裸地	○	○	○	○	△	△	△	△
生物との関わり		2	1	4	4	2	3	3		

		距離標(空間単位:1km)	10	11	12	13	14	15	16
理 の 生 息 環 境 の 生 息 環 境 の 注 目 点 と 存 続 性	魚 類	アユ	△	○	○	○	○	○	○
		連続する瀬と淵	△	○	○	○	○	○	○
		ミナメダカ	△	○	○	○	○	○	○
		ワンド・たまり	△	△	○	○	○	○	○
	鳥 類	オオヨシキリ	1	0	1	0	0	0	0
		水生植物帯	○	△	△	○	○	○	△
		イカルチドリ	1	0	0	0	0	0	0
		自然裸地	○	○	○	△	○	△	○
	生物との関わり(空間単位の強さの評価値)		2	1	2	4	3	3	3

◆ 代表区間の選定

「生物場の多様性の評価」と「生物との関わり」の強さの評価で集計した評価値に基づき、両者ともに高い1km区間を抽出する。

現地確認の上、代表区間を最終選定する。

距離標(空間単位:1km)		0	1	2
河川環境区分		区分1		
生息場の多様性の評価値		2	3	3
生物との関わり/の強さの評価値		2	1	3
代表区間候補の抽出		B	A	
代表区間の選定結果		★		
【選定理由】				
-区分1は評価値が高いが、車尾堀より下流までが汽水域となっている。				
-0k区間は評価値が低下しているが、区分1を代表する汽水環境が良好				
-0k区間は堤点(皆生大橋)があり、水辺の国勢調査の調査地点となっているため、モニタリングしやすい。				

距離標(空間単位:1km)		3	4	5	6	7	8	9
河川環境区分		区分2						
生息場の多様性の評価値		5	1	4	5	3	5	5
生物との関わり/強さの評価値		2	1	4	4	2	3	3
代表区間候補の抽出				B	A		B	B
代表区間の選定結果					★			
【選定理由】								
・区分2を代表する環境(自然裸地)が良好。								
・堤点標(八幡橋)がある。								

距離標(空間単位:1km)		10	11	12	13	14	15
河川環境区分		区分3					
生息場の多様性の評価値		5	1	3	5	6	4
生物との関わり方の強さの評価値		2	1	2	4	3	3
代表区間候補の抽出					B	B	I
代表区間の選定結果					★		
【選定理由】		・区分3を代表する環境(自然裸地、連続する瀬と淵、ワンド・たまり等)が良好。 ・山付き区間となっている。 ・右岸堤防上から区間を見渡すことができる。					

A: 区分内で両者ともに1位

B: 区分内で両者ともに2位以内

◆ 保全区間の選定

特殊性の観点等から、保全すべき特殊な場として保全区間候補を抽出する。

現地確認の上、保全区間を最終選定する。

保全区間の選定		距離(空間単位:1km)	0	1	2
保全区間の選定	保全区間の選定	河川環境区分	2	3	3
		生息場の多様性の評価値	2	3	3
		生物との関わり	2	1	3
		代表区間の抽出	B	A	
		代表区間の選定結果	★		
		【選定理由】	-区分1は評価値が高いが、車尾堀より下流までが汽水域となっている。 -0k区間は評価値が低下しているが、区分1を代表する汽水環境が良好 -0k区間は堤点(皆生大橋)があり、水辺の調査の調査地点となっているため、モニタリングしやすい。		

保全区間の選定		距離(空間単位:1km)	3	4	5	6	7	8	9
保全区間の選定	保全区間の選定	河川環境区分	5	1	4	5	3	5	5
		生息場の多様性の評価値	5	1	4	5	3	5	5
		生物との関わり	2	1	4	4	2	3	3
		代表区間の抽出	B	A	A	B	B		
		代表区間の選定結果			★				
		【選定理由】	-区分2を代表する環境(自然裸地)が良好。 -堤点(八幡橋)がある。						

保全区間の選定		距離(空間単位:1km)	10	11	12	13	14	15	16
保全区間の選定	保全区間の選定	河川環境区分	5	1	3	5	6	4	5
		生息場の多様性の評価値	5	1	3	5	6	4	5
		生物との関わり	2	1	2	4	3	3	3
		代表区間の抽出			B	B		B	
		代表区間の選定結果			★				
		【選定理由】	-区分3を代表する環境(自然裸地、連続する瀬と淵、ワンド・たまり等)が良好。 -山付き区間となっている。 -右岸堤防上から区間を見渡すことができる。						

参考資料3 河川環境管理シート

(2) 代表区間・保全区間の選定結果 法勝寺川

河川環境区分シート

- 河川環境区分は、河川環境が類似し、相対的な順位付けが可能な範囲で、河川管理上、効率的な数に区分する。
- 河川環境区分の設定に際しては、「河川整備基本方針」、「河川整備計画」の境界部と整合を図ることが重要である。

代表区間選定シート

区分1

区分2

◆ 生息場の多様性の評価

「河川環境区分」ごとに各環境要素の中央値を算出し、中央値を基準に区分毎に評価(○×△)する。

↓

区分毎に評価値を集計する。

距離標(空間単位:1km)		0	1	2	3	4	5	6	7
典型性	陸域	1. 低・中茎草地	○	○	△	△	△	○	△
		2. 河辺性の樹林・河畔林	○	○	△	△	△	○	△
		3. 自然裸地	○	○	△	△	△	○	△
		4. 外来植物生育地	×	×	△	×	×	×	△
	水際域	5. 水生植物帯	△	△	○	○	○	○	△
		6. 水際の自然度	△	○	○	○	○	○	○
		7. 水際の複雑さ	○	○	○	△	△	△	○
	水域	8. 連続する瀬と淵	△	○	○	△	○	○	△
		9. ワンド・たまり	×	×	△	×	△	△	△
		10. 湛水域	×	×	△	×	△	△	△
	汽水	11. 干潟	-	-	-	-	-	-	-
	水	12. ヨシ原	-	-	-	-	-	-	-
生息場の多様性の評価値		2	2	6	4	1	1	4	4

◆ 生物との関わりの強さの評価

「河川環境区分」ごとに注目種を選定する。(選定手順は右上図参照)

↓

区間毎に注目種が依存する環境要素(典型性12項目)の多寡を「○」の数にて評価する。

距離標(空間単位:1km)		0	1	2	3	4	5	6	7
種・個体の数と依存する環境要素(注目種)	魚類	ミナミアカヒレタビラ	-	-	○	○	△	△	△
		スナヤツメ類	-	-	○	○	△	△	△
		連続する瀬と淵	△	△	○	○	○	○	○
	鳥類	カワセミ	○	○	○	○	○	○	○
		ワンド・たまり	○	○	○	○	○	○	○
		イカルチドリ	○	○	○	○	○	○	○
		自然裸地	○	○	○	○	○	○	○
	生物との関わりの強さの評価値	1	2	3	1	2	1	1	1

◆ 代表区間の選定

「生物場の多様性の評価」と「生物との関わりの強さの評価」で集計した評価値に基づき、両者ともに高い1km区間を抽出する。

↓

現地確認の上、代表区間を最終選定する。

距離標(空間単位:1km)	0	1	2	3	4	5	6	7
河川環境区分	区分1							
生息場の多様性の評価値	2	2	6	4	1	1	4	4
生物との関わりの強さの評価値	1	2	3	1	2	1	1	1
代表区間候補の抽出			A					
代表区間の選定結果			★					
【選定理由】								
・区分1を代表する環境(自然裸地、低・中茎草地、ワンド・たまり等)が良好。								
・視点場(新青木橋、第一青木橋)がある。								
・法勝寺川の特徴であるワンド・たまりの面積が最も広い区間である。								

◆ 保全区間の選定


特殊性の観点等から、保全すべき特殊な場として保全区間候補を抽出する。

↓

現地確認の上、保全区間を最終選定する。

距離標(空間単位:1km)		0	1	2	3	4	5	6	7
(特殊性)	陸河原の植生域								
	湧水地								
	海浜植生帯		-	-	-	-	-	-	-
	塩沼湿地		-	-	-	-	-	-	-
	汽水域		-	-	-	-	-	-	-
	山付き区間								
	湛水域		○	○	○		○		○
	桜並木								
地形・景観等	支川との合流				●小松谷川				●
								大谷川、北方川	
重要種保護の観点より非公表									
歴史文化・利用									
	保全区間候補の抽出		○	○			○		
保全区間の選定結果			★			★			
重要種保護の観点より非公表									

2		3		4		5		6		7		8		9		10			
区分1 (緩流域・多様な水辺構造)																		区分2 (発達した瀬淵・渚水域)	
法勝寺川																			
セグメント2-1										セグメント1									
セグメント1-②										セグメント1									
農地又は住宅										農地又は住宅									



<典型性12項目の評価方法>

- ①〜③、⑤〜⑦、⑨、⑪、⑫
- 中央値より大: ○ (1点)
- 中央値より小: △ (0点)
- ④、⑩
- 中央値より大: × (-1点)
- 中央値より小: △ (0点)
- ⑧
- 瀬・淵の両方が中央値より大: ○ (1点)
- 瀬・淵のどちらかが中央値より大: △ (0点)
- ⊖ : 評価対象外であることを示す

- A : 区分内で両者ともに1位
- B : 区分内で両者ともに2位以内

(3) 河川環境の経年変化の整理結果 日野川

河川環境経年変化シート

◆ 経年変化情報①：生息場の多様性の評価値の経年変化 (平成19年度(2007年度)→令和4年度(2022年度))

距離標(空間単位:1km)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2時期の評価の比較	陸域																	
	1.低・中茎草地	○	○	△	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	2.河辺性の樹林・河畔林	-	-	-	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	3.自然裸地	-	-	-	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	4.外来植物	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	5.水生植物帯	-	-	-	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	6.水際の自然度	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	7.水際の複雑さ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	8.連続する瀬淵	-	-	-	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	9.フンド・たまり	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	10.湛水域	-	-	-	-	△	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.干潟	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.ヨシ原	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生息場の多様性の評価値の比較	H19	4	1	4	6	0	4	1	6	4	3	4	1	5	2	3	3	4
	R4(現況・基準年)	2	3	3	5	1	4	5	3	5	5	5	1	3	5	6	4	5
	評価値の差(H19-R4)	-2	-2	-1	-1	1	0	-4	-3	1	-2	1	0	-2	-3	-3	-1	-1

- ・代表区間選定シートの生息場の多様性の評価の2時期の評価値を比較
- ・マスに2つ並んでいる記号(○△×)の左側はH19、右側はR4の評価を示す。
 - (評価項目4,10以外)：各区分のR4の中央値より大きい場合(+1点)
 - △(評価項目1~12)：各区分のR4の中央値より小さい場合(0点)
 - ×(評価項目4,10)：各区分のR4の中央値より大きい場合(-1点)


○：値がゼロ
-：評価対象外

○△ 回復傾向
△△ 回復傾向
×△ 回復傾向
×- 回復傾向
○○ 良好で維持

○△ 悪化傾向
○- 悪化傾向
△× 悪化傾向
-× 悪化で維持
×× 悪化で維持

評価値の変化が大きい(±3以上)の区間について、次頁以降で分析

◆ 経年変化情報②：生息場の変化量(平成19年度(2007年度)→令和4年度(2022年度))




(3) 河川環境の経年変化の整理結果 日野川

■ 評価値の変化が大きい区間の分析（日野川6k区間）

- ・みお筋が動き、右岸側のみお筋はワンド化した。
⇒河道掘削、深ぼれ部の埋戻し、出水等により、ワンドが形成されたことや、砂州上の植生が攪乱を受けて外来植物が減少、水生植物帯等が増加したため、環管シートの評価が上昇したと考えられる。

◆ 空中写真の経年変化




※写真出典：平成18年：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果

◆ 河川環境管理シート（環管シート）における評価結果

評価項目	評価値の変化 (H19→R4)	変化量 (H19→R4)	単位
1.低・中茎草地面積	↑	+0.4	面積(ha)
2.河辺性の樹林・河畔林	→	0.0	延長(km)
3.自然裸地	→	-1.5	面積(ha)
4.外来植物	↑	-1.4	面積(ha)
5.水生植物帯	↑	+1.4	面積(ha)
6.水際の自然度	→	左岸 -5.0 右岸 +7.4	%
7.水際の複雑さ	→	-1.5	水際延長/流心延長
8.連続する瀬淵	→	早瀬 +1.8 淵 -1.2	面積(ha)
9.ワンド・たまり	↑	+0.4	面積(ha)
10.湛水域	→	0.0	面積(ha)

◆ 横断の経年変化（6.4k）




(3) 河川環境の経年変化の整理結果 日野川

■ 評価値の変化が大きい区間の分析（日野川7k区間）

- ・砂州に土砂が堆積に比高差が拡大し、左岸側のみお筋も縮小した。

⇒二極化が進行したことで、砂州上の植生が攪乱を受けにくくなり外来植物が増加したことや、みお筋が狭まり水際の複雑さが低下したことで、環管シートの評価が低下したと考えらえる。

◆ 空中写真の経年変化




※写真出典：平成18年：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果

◆ 河川環境管理シート（環管シート）における評価結果

評価項目	評価値の変化 (H19→R4)	変化量 (H19→R4)	単位
1.低・中茎草地面積	↓	-0.3	面積(ha)
2.河辺性の樹林・河畔林	→	-0.2	延長(km)
3.自然裸地	→	-0.4	面積(ha)
4.外来植物	↓	+0.5	面積(ha)
5.水生植物帯	→	-0.1	面積(ha)
6.水際の自然度	→	左岸 -1.6 右岸 18.0	%
7.水際の複雑さ	↓	-2.9	水際延長/流心延長
8.連続する瀬淵	→	早瀬 -1.2 淵 -0.5	面積(ha)
9.ワンド・たまり	→	0.0	面積(ha)
10.湛水域	→	0.0	面積(ha)

◆ 横断の経年変化（7.8k）




(3) 河川環境の経年変化の整理結果 日野川

■ 評価値の変化が大きい区間の分析（日野川13k区間）

- ・自然裸地が広がり、右岸の水制工の周囲等に小さなワンドが複数出現した。
⇒河道掘削、出水等により、水制工周辺にワンドが形成されたことや、砂州上の植生が攪乱を受けて低・中茎草が増加したため、環管シートの評価が上昇したと考えられる。
- 一方で、連続する瀬・淵については、評価は上昇したが、実際の変化は小さいと考えられる。

◆ 空中写真の経年変化




※写真出典：平成18年：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果

◆ 河川環境管理シート（環管シート）における評価結果

評価項目	評価値の変化 (H19→R4)	変化量 (H19→R4)	単位
1.低・中茎草地面積	↑	+0.7	面積(ha)
2.河辺性の樹林・河畔林	→	+0.2	延長(km)
3.自然裸地	→	0.0	面積(ha)
4.外来植物	→	0.0	面積(ha)
5.水生植物帯	→	-0.2	面積(ha)
6.水際の自然度	→	左岸 -3.5 右岸 0.0	%
7.水際の複雑さ	→	+0.5	水際延長/流心延長
8.連続する瀬淵	↑	早瀬 +0.5 淵 +1.8	面積(ha)
9.ワンド・たまり	↑	+0.2	面積(ha)
10.湛水域	→	0.0	面積(ha)

◆ 横断の経年変化（13.8k）



(3) 河川環境の経年変化の整理結果 日野川

■ 評価値の変化が大きい区間の分析（日野川14k区間）

・平成18年から令和3年にかけて、尾高堰の上流側では、二又に分かれていたみお筋の片方（左岸側）が狭まり、令和4年度にはワンド化している。

⇒みお筋の片方がワンド化した結果、水際の複雑さやワンド・たまりが増加し、環管シートの評価が上昇したと考えられる。

一方で、河辺性の樹林・河畔林は、評価は上昇したが、実際の変化は小さいと考えられる。

◆ 空中写真の経年変化




※写真出典：平成18年：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果

◆ 河川環境管理シート（環管シート）における評価結果

評価項目	評価値の変化 (H19→R4)	変化量 (H19→R4)	単位
1.低・中茎草地面積	→	-0.1	面積(ha)
2.河辺性の樹林・河畔林	↑	+0.1	延長(km)
3.自然裸地	→	+0.4	面積(ha)
4.外来植物	→	+0.2	面積(ha)
5.水生植物帯	→	+0.4	面積(ha)
6.水際の自然度	→	左岸 -1.3 右岸 +10.0	%
7.水際の複雑さ	↑	+0.4	水際延長/流心延長
8.連続する瀬淵	→	早瀬 -0.4 淵 0.0	面積(ha)
9.ワンド・たまり	↑	+0.3	面積(ha)
10.湛水域	→	+0.2	面積(ha)

◆ 横断の経年変化（14.4k）



(3) 河川環境の経年変化の整理結果 法勝寺川

河川環境経年変化シート


◆ 経年変化情報①：生息場の多様性の評価値の経年変化 (平成19年度(2007年度)→令和4年度(2022年度))

距離標(空間単位:1km)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2時期の評価の比較	陸域											
	1.低・中茎草地	—	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△
	2.河辺性の樹林・河畔林	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△
	3.自然裸地	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	4.外来植物	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	5.水生植物帯	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	6.水際の自然度	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	7.水際の複雑さ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	8.連続する瀬淵	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	9.ワンド・たまり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10.湛水域	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	11.干潟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12.ヨシ原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生息場の多様性の評価値の比較												
H19		1	1	3	2	3	2	3	2	3	4	1
R4(現況・基準年)		2	2	6	4	1	1	4	4	5	2	4
評価値の差(H19-R4)		1	1	3	2	-2	-1	1	2	2	-2	3

- ・代表区間選定シートの生息場の多様性の評価の2時期の評価値を比較
- ・マスに2つ並んでいる記号(○△×)の左側はH19、右側はR4の評価を示す。
 - (評価項目4,10以外)：各区分のR4の中央値より大きい場合(+1点)
 - △(評価項目1~12)：各区分のR4の中央値より小さい場合(0点)
 - ×(評価項目4,10)：各区分のR4の中央値より大きい場合(-1点)
- ：値がゼロ
- ：評価対象外

○	回復傾向	○△	悪化傾向
△	回復傾向	○-	悪化傾向
×	回復傾向	△×	悪化傾向
×	回復傾向	△-	悪化傾向
○	良好で維持	×	悪化で維持
○	良好で維持	×	悪化で維持

◆ 経年変化情報②：生息場の変化量(平成19年度(2007年度)→令和4年度(2022年度))



(3) 河川環境の経年変化の整理結果 法勝寺川

- 評価値の変化が大きい区間の分析（法勝寺川2k区間）
- ・支川処理対策（背割堤整備、四ヶ村堰可動化、河道掘削）が実施され、河道掘削箇所の一部がワンド化した。
- ⇒額縁掘削を実施した箇所がワンド化した結果、ワンド・たまりが増加して環管シートの評価が上昇したと考えられる。
- 一方で、自然裸地、外来植物は、評価は上昇したが、実際の変化は小さいと考えられる。

◆ 空中写真の経年変化




※写真出典：平成18年：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果

◆ 河川環境管理シート（環管シート）における評価結果

評価項目	評価値の変化 (H19→R4)	変化量 (H19→R4)	単位
1.低・中茎草地面積	→	+0.1	面積(ha)
2.河辺性の樹林・河畔林	→	+0.1	延長(km)
3.自然裸地	↑	+0.1	面積(ha)
4.外来植物	↑	-0.2	面積(ha)
5.水生植物帯	→	+0.1	面積(ha)
6.水際の自然度	→	左岸 -22.0 右岸 -10.1	%
7.水際の複雑さ	→	+0.5	水際延長/流心延長
8.連続する瀬淵	→	早瀬 0.0 淵 0.0	面積(ha)
9.ワンド・たまり	↑	+0.2	面積(ha)
10.湛水域	→	+0.2	面積(ha)

◆ 横断の経年変化 (2.0k)



参考資料3 河川環境管理シート

(3) 河川環境の経年変化の整理結果 法勝寺川

■ 評価値の変化が大きい区間の分析（法勝寺川10k区間）

・ 河道掘削が実施され、低水路幅が広がった。

⇒ 低水路幅が広がったが、環管シート上、評価上昇がみられた各項目の変化量は小さく、河川環境の変化は小さいと考えられる。

◆ 空中写真の経年変化




※写真出典：平成18年：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果

◆ 河川環境管理シート（環管シート）における評価結果

評価項目	評価値の変化 (H19→R4)	変化量 (H19→R4)	単位
1.低・中茎草地面積	→	0.0	面積(ha)
2.河辺性の樹林・河畔林	↑	+0.2	延長(km)
3.自然裸地	↑	0.0	面積(ha)
4.外来植物	→	-0.1	面積(ha)
5.水生植物帯	↑	0.0	面積(ha)
6.水際の自然度	→	左岸 -2.7 右岸 -4.0	%
7.水際の複雑さ	↑	+0.1	水際延長/流心延長
8.連続する瀬淵	→	早瀬 -0.1 淵 -0.2	面積(ha)
9.ワンド・たまり	→	0.0	面積(ha)
10.湛水域	↓	+0.1	面積(ha)

◆ 横断の経年変化（10.2k）





参考資料4 測量縦断の経年変化



(1) 日野川

【日野川下流地区（河口～2.6k付近）】概ね安定しているが、0kは、河口砂州の消長による河床高の変化が大きい。
【日野川中流地区（2.6k付近～17.0k付近）】2.6k～5.6kは、堰改築やそれに伴う河道掘削による河床低下がみられる。
それ以外は概ね安定しているが、水衝部などで局所的な深掘れ傾向がみられる。

◆縦断形状の変遷（左：平均河床高、右：最深河床高）



◆昭和48年からの縦断形状の変化量（左：平均河床高、右：最深河床高）





参考資料4 測量縦断の経年変化



(2) 法勝寺川

- ・0-2kは、法勝寺堰改築や河道掘削による河床低下がみられる。
- ・2k-10.9kは概ね安定しているが、堰直下などで局所的な深掘れ傾向がみられる。

◆縦断形状の変遷（左：平均河床高、右：最深河床高）



◆昭和48年からの縦断形状の変化量（左：平均河床高、右：最深河床高）



参考資料5 通し回遊性の魚類・底生動物の確認状況

・日野川水系には、通し回遊性（一生のうちに川と海を行き来する回遊を行う性質）を有する主として、魚類17種、底生動物9種が生息。

◆ 通し回遊性の魚類の確認状況（個体数）

調査年度 重要種	日野川							法勝寺川						
	H6	H11	H16	H21	H26	R1	R6	H6	H11	H16	H21	H26	R1	R6
カワヤツメ	重要種保護の観点より非公表													
ニホンウナギ														
ワカサギ														
アユ	501	269	404	469	130	54	310	-	-	-	2	1	-	35
サケ	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
サクラマス	重要種保護の観点より非公表													
カマキリ（アユカケ）														
カジカ中卵型														
カワアナゴ														
シロウオ														
ヌマチチブ	6	64	327	34	107	68	108	-	-	-	-	-	-	-
チチブ	-	-	-	90	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
シマヨシノボリ	13	53	129	59	86	80	174	-	-	-	-	16	6	110
オオヨシノボリ	重要種保護の観点より非公表													
ゴクラクハゼ	29	308	207	138	171	542	815	-	-	-	-	-	-	1
スミウキゴリ	-	-	46	12	11	13	23	-	-	-	-	-	-	3
ウキゴリ	6	18	40	15	67	16	57	-	-	-	1	-	-	4

備考1) 河川水辺の国勢調査における確認状況を示す。

2) サクラマスには、同種で生活史が異なるヤマメを含まない。

◆ 通し回遊性の底生動物の確認状況（個体数）

調査年度 重要種	日野川						法勝寺川					
	H6	H11	H16	H22	H27	R2	H6	H11	H16	H22	H27	R2
ヤマトヌマエビ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ミゾレヌマエビ	-	-	32	102	84	1272	-	-	6	-	2	16
ヒメヌマエビ	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
ヌマエビ	-	-	32	22	-	56	-	-	94	-	-	-
ミナミテナガエビ	-	-	1	-	1	17	-	-	1	-	-	11
ヒラテナガエビ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
テナガエビ	-	-	281	9	14	73	-	-	3	-	-	-
スジエビ	-	-	2	11	5	25	-	-	12	2	2	2
モクズガニ	-	-	78	6	7	26	-	-	16	1	2	8

備考) 河川水辺の国勢調査における確認状況を示す。

参考資料6 魚類の遡上環境の劣化への対応状況(詳細)


- ・車尾堰は、平成20年度に、既設魚道の改良や新たな魚道整備を実施した。(国が実施)
- ・蚊屋堰、五千石堰、尾高堰、佐野川堰は、平成24年度から令和4年度にかけて、既設魚道の改良や新たな魚道整備を実施した。(鳥取県が実施)
- ・四ヶ村堰は、小松谷川の支川処理対策(～令和元年度)において、小松谷川側の堰を可動化し、魚道を整備した。(国が実施)

四ヶ村堰



小松谷川側の堰を可動化し、右岸にハーフコーン式魚道を整備

※空中写真出典
平成21年：地図・空中写真閲覧サービス(国土地理院)
令和3年：「日野川水系航空レーザ測量業務」成果





車尾堰




蚊屋堰

堰左岸の階段式魚道を、粗石つき扇形斜路式魚道に改良
※整備前後とも写真なし

五千石堰



佐野川堰



尾高堰



参考資料7 河床が泥・砂泥で緩水環境を好む多様な動植物が生息する環境の創出の整備候補箇所の選定

・法勝寺川は全体的に流下能力が不足していることから、河積を変えない、あるいは河積を大きくする整備を基本とする。そのような整備が可能と考えられる箇所は以下のとおり。

重要種保護の観点より非公表

重要種保護の観点より非公表

備考) 整備した環境の維持可能性等も考慮して、整備箇所・形状を検討する。

重要種保護の観点より非公表

備考) 整備した環境の維持可能性等も考慮して、整備箇所・形状を検討する。

